

UNIQUIN®F



CLASE FARMACOLÓGICA.

Norfloxacin. Código ATC: J01MA06
Fenazopiridina. Código ATC: G04BX06

COMPOSICIÓN.

Cada cápsula contiene norfloxacin 400 mg, fenazopiridina HCl 100 mg, excipientes c.s.

FORMA FARMACÉUTICA.

Cápsula.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Antibiótico, analgésico.

INDICACIONES.

UNIQUIN®F está indicado en el tratamiento de infecciones agudas, crónicas y recurrentes del tracto urinario, asociadas a dolor y espasmo, tales como: Pielonefritis, pielitis, cistopielitis, cistitis, prostatitis, uretritis. Profilaxis de sepsis en pacientes neutropénicos.

Por la presencia de fenazopiridina en su composición produce en pocos minutos alivio de los síntomas urinarios dolorosos, como disuria, ardor y tenesmo vesical.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.

Según criterio médico. Como posología de orientación se aconseja 1 cápsula cada 12 horas durante 7 a 10 días.

En cistitis aguda no complicada se recomienda 1 cápsula cada 12 horas durante 3 días.

En infecciones crónicas recurrentes del aparato urinario se recomienda 1 cápsula cada 12 horas.

En gonorrea (uretritis, prostatitis o cervicitis gonocócica aguda), se recomiendan 2 cápsulas en una sola toma al día, durante 5 días.

Se recomienda su ingesta 1 hora antes o 2 horas después de las comidas.

EFFECTOS SECUNDARIOS.

El fármaco es generalmente bien tolerado, en algunos pacientes pueden presentarse náuseas, vómitos o diarrea.

SOBREDOSIS.

En caso de sobredosis inducir al vómito, realizar lavado gástrico, monitorear estrechamente las condiciones del paciente e hidratarlo adecuadamente.

La sobredosis con fenazopiridina puede provocar metahemoglobinemia, anemia hemolítica, toxicidad hepática y/o renal.

CONTRAINDICACIONES.

Menores de 18 años de edad. Afecciones hepáticas o renales graves. Hipersensibilidad conocida a los derivados de las quinolonas y/o sus componentes.

EMBARAZO Y LACTANCIA.

No se recomienda su uso durante los dos primeros trimestres del embarazo. Según criterio médico a partir del tercer trimestre de embarazo. No debe administrarse durante la lactancia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

Anticoagulantes derivados de cumarina, anticonvulsivos del grupo hidantoína, hipoglucemiantes orales, depresores de la médula ósea, ciclosporina, hemolíticos, metotrexato o fenilbutazona, penicilina. Las quinolonas en general pueden incrementar los efectos de warfarina o sus derivados.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Se recomienda administrar con cautela en pacientes con antecedentes de síndrome convulsivo y pacientes con disfunción renal severa.

FENAZOPIRIDINA PIGMENTA LA ORINA DE COLOR ROJIZO. COLORACIÓN QUE DESAPARECE CON LA FINALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN.

Almacenar a temperatura no mayor a 30 °C en el envase original. Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica. No usar después de la fecha de vencimiento. No contiene gluten.

“Consultar con su médico periódicamente para revisiones preventivas.”

Contáctenos a través de las líneas gratuitas:

Servicio de atención al consumidor: 800 16 2222

Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636

Para información complementaria y regionalizada visitar nuestra página web: www.breskotpharma.com

PRESENTACIÓN.

Estuche x 100 cápsulas



SCIENCE. LIFE. HOPE.

GMP
CERTIFIED QUALITY

Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Farmoquímica S.A. Calle V. Eduardo 2293 La Paz - Bolivia Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operaciones Bioseguras, Operador Económico Autorizado (OEA). Cumpliendo con la norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados por IBMETRO de acuerdo a condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519

Somos una empresa socialmente comprometida, promovemos la bioseguridad, el cuidado del medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo.



01/22

