

CAPLAX®



CLASE FARMACOLÓGICA.

Clopidogrel. Código ATC: B01AC04

COMPOSICIÓN.

Cada comprimido recubierto contiene clopidogrel 75 mg, excipientes c.s.

FORMA FARMACÉUTICA.

Comprimido.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Antitrombótico, antiagregante plaquetario.

INDICACIONES.

CAPLAX® está indicado en la prevención de eventos vasculares isquémicos tales como: infarto de miocardio, accidente cerebro vascular isquémico, muerte cerebral, síndrome coronario agudo y en pacientes con antecedentes de aterosclerosis sintomática.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.

Según criterio médico. Como posología media de orientación se aconseja:

En infarto agudo de miocardio reciente, ataque cardíaco reciente y enfermedad arterial periférica establecida 1 comprimido cada 24 horas.

En síndrome coronario agudo (angina inestable / IAM sin onda Q) el tratamiento debe iniciarse con una dosis de ataque única de 4 comprimidos, seguida de 1 comprimido cada 24 horas.

EFFECTOS SECUNDARIOS.

Clopidogrel en general es bien tolerado. Puede presentarse dolor abdominal, dispepsia, gastritis, diarrea, constipación, hemorragia gastrointestinal, neutropenia, erupciones, palpitaciones, síncope, astenia, neuralgia, parestesia y vértigo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Utilizar con precaución en pacientes con riesgo de sangrado por trauma, cirugía u otra condición patológica. En casos de cirugía electiva donde no se desea el efecto antiagregante plaquetario, suspender la administración de clopidogrel 5 días antes.

Se tiene poca experiencia en pacientes con enfermedad hepática grave, quienes pueden presentar diátesis hemorrágica.

No se requiere ajustar la dosis para pacientes de edad avanzada o pacientes con enfermedad renal.

SOBREDOSIS.

Contacte a su médico o acuda al servicio de urgencia más cercano ya que existe un mayor riesgo de hemorragia. No se observaron eventos adversos después de la administración oral única de 600 mg de clopidogrel en voluntarios sanos.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad. Insuficiencia hepática severa. Hemorragia patológica activa, por ejemplo úlcera péptica o hemorragia intracraneal.

EMBARAZO Y LACTANCIA.

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

Heparina y warfarina podrían incrementar el riesgo de sangrado, por tanto, el uso concomitante debe realizarse con precaución.

AINEs deben ser coadministrados con precaución, porque podrían incrementar el riesgo de sangrado intestinal.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN.

Almacenar a temperatura no mayor a 30 °C en su envase original.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

No usar después de la fecha de vencimiento.

No contiene gluten.

“Consulte con su médico periódicamente para revisiones preventivas.”

Contactenos a través de las líneas gratuitas:

Servicio de atención al consumidor: 800 16 2222

Centro de Farmacovigilancia: 800 16 2636

Para información complementaria y regionalizada visite nuestra página web:

www.breskotpharma.com

PRESENTACIÓN.

Estuche x 35 comprimidos



SCIENCE. LIFE. HOPE.



Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Fardoquímica S.A. Calle V. Eduardo 2293

La Paz - Bolivia Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG):

Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, ISO 9001:2015

gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud

en el trabajo, Operaciones Bioseguras, Operador Económico Autorizado (OEA). Cumpliendo con la

norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados por IBMETRO de acuerdo a

condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519

Somos una empresa socialmente comprometida, que promueve la bioseguridad, el cuidado del medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo.

