

FLEXIMICINA® FORTE

CLASE FARMACOLÓGICA.

Amoxicilina. Código ATC: J01CA04

COMPOSICIÓN.

Cada comprimido dispersable contiene amoxicilina base de origen enzimático 1 g, excipientes c.s.

FORMA FARMACÉUTICA.

Comprimido dispersable.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Antibiótico betalactámico de amplio espectro.

INDICACIONES.

FLEXIMICINA® FORTE está indicado en el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, tracto urinario, piel y tejidos blandos, sepsis intraabdominal, osteomielitis y cualquier tipo de infección sensible a amoxicilina.

También está indicado en la terapia triasociada de supresión ácida gástrica, asociado con INHIBID® y CLARIX® para la erradicación de *Helicobacter pylori*.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.

Según criterio médico. Como posología de orientación se aconseja:

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido dispersable cada 12 horas durante 7 a 10 días.

Para la erradicación de *Helicobacter pylori*: 1 comprimido dispersable, asociado a INHIBID® y CLARIX®, administrados cada 12 horas, durante 7 a 14 días, según indicación médica.

Forma de administración: Dispersar 1 comprimido en medio vaso de agua (80 mL) remover e ingerir. Si quedase residuo, añadir un poco de agua, remover e ingerir nuevamente.

EFFECTOS SECUNDARIOS.

Amoxicilina produce muy pocas reacciones adversas, limitadas a la hipersensibilidad alérgica. En raras ocasiones pueden observarse erupción cutánea, molestias digestivas con modificación de la microbiota, diarrea, vómitos y dispepsia.

En raras ocasiones se han observado nefritis intersticial con necrosis tubular renal y síndrome nefrótico.

Las complicaciones hematológicas son raras asociadas a casos de hipersensibilidad. Se han descrito casos aislados de leucopenia, neutropenia, trombocitopenia.

SOBREDOSIS.

Con mayores dosis a las recomendadas pueden presentarse molestias abdominales como náuseas, vómitos o diarrea.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad a antibióticos betalactámicos (penicilinas y cefalosporinas).

EMBARAZO Y LACTANCIA.

Uso en el embarazo y la lactancia según criterio médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

No administrar con probenecid y antibióticos del grupo de las tetraciclinas y de cloranfenicol. No administrar conjuntamente con medicamentos antigotosos (alopurinol, febuxostat).

Como ocurre con otros antibióticos, puede reducir la eficacia de los anticonceptivos orales.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Debe usarse con precaución en pacientes con antecedentes de alergia a las penicilinas. En tratamientos prolongados deben efectuarse controles periódicos de la función renal, hepática y hematopoyética.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN.

Almacenar a temperatura no mayor a 30 °C y protegido de la humedad en su envase original. Mantener fuera del alcance de los niños.

No contiene gluten ni azúcar. Venta bajo receta médica.

No usar despues de la fecha de vencimiento.

“Consultar con su médico periódicamente para revisiones preventivas.”

Contáctenos a través de las líneas gratuitas:

Servicio de atención al consumidor: 800 16 2222

Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636

Para información complementaria y regionalizada visitar nuestra página web:

www.breskotpharma.com

PRESENTACIÓN.

Estuche x 20 comprimidos



SCIENCE. LIFE. HOPE.



Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Farmoquímica S.A. Calle V. Eduardo 2293 La Paz - Bolivia
Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operaciones Bioseguras, Operador Económico Autorizado (OEA). Cumpliendo con la norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados por IBMETRO de acuerdo a condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519

Somos una empresa socialmente comprometida, que promueve el cuidado del medio ambiente, la bioseguridad, la seguridad y salud en el trabajo.



08/21