

Flexicam®SL Flexicam®

CLASE FARMACOLÓGICA.

Meloxicam. Código ATC: M01AC06

COMPOSICIÓN.

Cada comprimido SL (sublingual) contiene:
Meloxicam 15 mg
Excipientes c.s.



Cada ampolla x 1,5 mL contiene:
Meloxicam 15 mg
Excipientes: Alcohol bencílico, propilenglicol, otros c.s.

FORMA FARMACÉUTICA.

Comprimido sublingual y solución inyectable.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Comprimido: Sublingual.

Ampolla: Intramuscular profunda.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Antiinflamatorio, analgésico,
antirreumático.

PROPIEDADES.

Meloxicam es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que inhibe de forma preferencial la enzima ciclooxigenasa-2. Presenta mínima acción sobre la ciclooxigenasa-1 por lo cual produce menores efectos secundarios a nivel gastrointestinal y renal. El comprimido sublingual permite una absorción rápida para una acción analgésica y antiinflamatoria selectiva en el sitio de la inflamación.

INDICACIONES.

FLEXICAM®SL y FLEXICAM® están indicados para el tratamiento de afecciones musculares y traumáticas, así como en procesos inflamatorios de tejidos blandos, vías aéreas y dismenorrea primaria. Artritis reumatoidea, osteoartritis dolorosa, artrosis, espondilitis anquilosante.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.

Según criterio médico. Como posología de orientación se aconseja:

FLEXICAM®SL: 1 comprimido sublingual cada 24 horas. Mantener el comprimido debajo de la lengua hasta que se disuelva por completo.

FLEXICAM® ampolla: 1 ampolla cada 24 horas por vía intramuscular profunda.

No exceder la dosis de 15 mg/día. No administrar en menores de 15 años.

EFFECTOS SECUNDARIOS.

Meloxicam es generalmente bien tolerado. Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, calambres abdominales, dispepsia, flatulencia, anorexia. Ocasionalmente cefalea, mareos o vértigo, erupciones cutáneas, aumento de los niveles plasmáticos de creatinina y urea, elevación de las aminotransferasas séricas. Raras veces, urticaria, estomatitis, anemia. Hematuria, proteinuria.

SOBREDOSIS.

En caso de presentarse se debe realizar lavado gástrico y medidas de protección general.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad. Úlcera gástrica o duodenal activa. Insuficiencia hepática severa e insuficiencia renal severa no dializada. Historia de hipersensibilidad a ASA o a otros AINEs. Tratamiento del dolor perioperatorio en cirugías de revascularización.

EMBARAZO Y LACTANCIA.

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia, salvo criterio médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

Meloxicam puede aumentar el efecto de anticoagulantes orales y heparina, la toxicidad hematológica de metotrexato, el efecto hipoglucemiante de sulfonilúreas, la concentración plasmática de digoxina y/o litio, la nefrotoxicidad de ciclosporina y el uso simultáneo con ASA reduce recíprocamente la biodisponibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Pacientes con antecedentes úlcera gastroduodenal, colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Las afecciones hematológicas y los problemas de coagulación requieren supervisión constante. Especial precaución en pacientes con insuficiencia renal, cardíaca, hipovolemia y en aquellos tratados con diuréticos. En pacientes de edad avanzada, delicados o muy delgados, se recomienda utilizar la dosis mínima efectiva. Con meloxicam al igual que con otros AINEs, puede presentarse una elevación de una o más enzimas hepáticas. En pacientes con porfiria hepática puede desencadenar un ataque.

Por contener alcohol bencílico en la solución inyectable, está contraindicado en niños menores de 3 años. Propilenglicol puede producir somnolencia, que afecta la capacidad para conducir, manejar herramientas y maquinaria.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN.

Comprimido SL: Almacenar a temperatura no mayor a 30 °C y protegido de la humedad en su envase original. No contiene gluten ni azúcar.

Ampolla: Almacenar a temperatura no mayor a 30 °C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No usar después de la fecha de vencimiento. Venta bajo receta médica.

“Consulte con su médico periódicamente para revisiones preventivas”

Contáctenos a través de las líneas gratuitas:

Servicio de atención al consumidor: 800 16 2222

Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636

Para información complementaria y regalizada visitar nuestra página web:
www.breskotpharma.com

PRESENTACIÓN.

Estuche x 30 comprimidos SL

Estuche x 3 ampollas



SCIENCE. LIFE. HOPE.



Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Farmoquímica S.A. calle V. Eduardo 2293 La Paz - Bolivia
Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operaciones Bioseguras, Operador Económico Autorizado (OEA). Cumpliendo con la norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados por IBMETRO de acuerdo a condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519

Somos una empresa socialmente comprometida, que promueve el cuidado del medio ambiente, la bioseguridad, la seguridad y salud en el trabajo.



05/21

8044

