



CLASE FARMACOLÓGICA.

Febuxostat. Código ATC: M04AA03

COMPOSICIÓN.

URIX[®]40

Cada comprimido recubierto contiene febuxostat 40 mg, excipientes c.s.

URIX[®]80

Cada comprimido ranurado recubierto contiene febuxostat 80 mg, excipientes c.s.

FORMA FARMACÉUTICA.

Comprimido.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Antigotoso. Hipouricemiente selectivo.

PROPIEDADES.

Febuxostat es un principio activo aprobado por la EMEA y la FDA. Es un fármaco de estructura no purínica, que inhibe de forma potente y selectiva las isoformas oxidada y reducida de la enzima xantina oxidasa. Por ser selectivo no inhibe otras enzimas del metabolismo de las purinas o de las pirimidinas.

Febuxostat es efectivo en la reducción y el control adecuado de la uricemia, cuando el objetivo es alcanzar su nivel mínimo. Permite la disolución de los cristales de urato y es un efectivo tratamiento en los pacientes con gota. Su intensa actividad reductora de la uricemia y su farmacocinética no dependiente de la función renal lo hacen especialmente útil en los pacientes con enfermedad renal crónica, en aquellos pacientes con uricemias basales más elevadas (en los que la consecución de la diana de uricemia requerirá dosis más elevadas de alopurinol) y en los casos con depósito de urato extenso.

INDICACIONES.

URIX[®]40, URIX[®]80 están indicados en el tratamiento de la hiperuricemia crónica en pacientes con gota, en situaciones en las que ya se ha producido deposición de urato, incluyendo antecedentes o presencia de tofos y/o artritis gotosa.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.

Según criterio médico. Como posología de orientación se aconseja: Como dosis inicial 40 mg cada 24 horas. Si el paciente no alcanza concentraciones de ácido úrico sérico menores a 6 mg/dl se recomienda aumentar la dosis a 80 mg cada 24 horas.

EFFECTOS SECUNDARIOS.

Náuseas, dolor articular, erupción cutánea, disfunción hepática, exacerbación transitoria de la gota e hipotiroidismo.

SOBREDOSIS.

No se tiene antecedentes de sobredosis.

CONTRAINDICACIONES.

Menores de 18 años de edad, pacientes que están siendo tratados con azatioprina, mercaptopurina o teofilina. Cardiopatía isquémica o antecedentes de infarto agudo de miocardio.

EMBARAZO Y LACTANCIA.

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia, salvo criterio médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

No es necesario un ajuste de dosis con colchicina, naproxeno, indometacina, hidroclorotiazida, warfarina.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Exacerbación de la Gota:

Al iniciar el tratamiento, con frecuencia se registra un incremento transitorio de las crisis gotosas, situación que hace necesaria la asociación con un AINE y no requiere la suspensión del tratamiento con febuxostat.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN.

Almacenar a temperatura no mayor a 30 °C en el envase original. Mantener fuera del alcance de los niños. No contiene gluten. Venta bajo receta médica.

No usar después de la fecha de vencimiento.

"Consultar con su médico periódicamente para revisiones preventivas."

Contactenos a través de las líneas gratuitas:

Servicio de atención al consumidor: 800 16 2222

Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636

Para información complementaria y regionalizada visitar nuestra página web: www.breskotpharma.com

PRESENTACIÓN.

Estuche x 20 comprimidos



SCIENCE. LIFE. HOPE.



Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Farmoquímica S.A. calle V. Eduardo 2293 La Paz - Bolivia
Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operaciones Bioseguras, Operador Económico Autorizado (OEA). Cumpliendo con la norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados por IBMETRO de acuerdo a condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519.

Somos una empresa socialmente comprometida, promovemos el cuidado del medio ambiente, la bioseguridad, la seguridad y salud en el trabajo.



8078



01/22