

INHIBID® PAC

Sin
azúcar

CLASE FARMACOLÓGICA.

Pantoprazol, amoxicilina, claritromicina. Código ATC: A02BD04

COMPOSICIÓN.

Cada sachet dual contiene:

Granulado x 5 g: pellets gastroresistentes de pantoprazol 40 mg, amoxicilina base 1 g de origen enzimático, excipientes: sucralosa, manitol, otros c.s.

Comprimido recubierto: claritromicina 500 mg, excipientes c.s.

FORMA FARMACÉUTICA.

Sachet dual: Granulado y comprimido.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Antiulceroso, antibacteriano.

PROPIEDADES.

INHIBID®PAC contiene pantoprazol, amoxicilina y claritromicina, es un tratamiento triasociado en presentación exclusiva en sachet dual, simplifica la terapia para erradicación de *Helicobacter pylori* y otorga comodidad posológica al paciente, evitándole la ingesta de 3 a 4 comprimidos en una sola toma.

Pantoprazol es un inhibidor de la bomba de protones, siendo único en su clase, por contar con el efecto inhibidor de la secreción ácida más sostenido en el tiempo.

Amoxicilina es un antibiótico betalactámico de amplio espectro. INHIBID®PAC utiliza amoxicilina de origen enzimático, la cual confiere al medicamento propiedades de pureza y seguridad superiores a las de amoxicilina convencional.

Claritromicina es un antibiótico macrólido de amplio espectro. INHIBID®PAC utiliza claritromicina de directa compresión que minimiza la cantidad de excipientes, reduciendo posibles efectos secundarios y otorgando una estabilidad garantizada al fármaco.

INDICACIONES.

Terapia triasociada para la erradicación de la infección por *Helicobacter pylori*.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.

Según criterio médico. Como posología media se aconseja 1 sachet dual cada 12 horas, durante 14 días. Disolver el contenido en un vaso con agua tibia e ingerir de forma conjunta con el comprimido.

EFFECTOS SECUNDARIOS.

En raros casos han sido descritas diarrea, cefalea y erupciones, las cuales no fueron de importancia y no obligaron a discontinuar el tratamiento.

SOBREDOSIS.

La administración de pantoprazol no ocasiona alteraciones clínicas relevantes, con amoxicilina se han reportado, en un reducido número de pacientes, nefritis intersticial con oliguria, falla renal, ambas reversibles con la suspensión del tratamiento, claritromicina ocasiona dolor de estómago, náuseas, vómitos, diarrea.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes. Claritromicina está contraindicada como terapia concomitante con astemizol, terfenadina o pimozida.

EMBARAZO Y LA LACTANCIA.

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

Amoxicilina puede interactuar con probenecid, cloranfenicol, eritromicina, sulfonamidas, tetraciclinas, anticonceptivos orales con estrógenos, metotrexato y alopurinol. Claritromicina puede interactuar con warfarina, carbamazepina, ciclosporina, digoxina, fenitoína, inhibidores de la HMG-CoA reductasa, itraconazol, tacrolimus, teofilina, colchicina, digoxina, rifabutina, rifampicina, alprazolam, midazolam, triazolam, zidovudina, aprepitant, eletriptán, eplerenona, ivabradina, metilprednisolona, sildenafil, sirolimus, tadalafil, atazanavir, efavirenz, tolterodina, repaglinida, ritonavir, tipranavir, saquinavir y verapamilo. Pantoprazol disminuye la biodisponibilidad de ketoconazol en un 30% y puede reducir la absorción de los ésteres de ampicilina (pivampicilina, bacampicilina), los antifúngicos imidazólicos (itraconazol, ketoconazol) y las sales de hierro.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Pantoprazol: insuficiencia renal o hepática. Amoxicilina: reacciones anafilácticas en personas con antecedentes familiares de hipersensibilidad a betalactámicos. Claritromicina: insuficiencia cardiaca, falla renal y/o hepática severa. Por contener manitol puede producir un efecto laxante leve.

LEYEDAS DE PROTECCIÓN.

Almacenar a temperatura no mayor a 30°C y protegido de la humedad. Mantener fuera del alcance de los niños. No contiene azúcar. Venta bajo receta médica. No usar después de la fecha de vencimiento.

"Consulte con su médico periódicamente para revisiones preventivas."

Contáctenos a través de nuestras líneas gratuitas:

Servicio de atención al consumidor: 800 16 2222

Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636

Para información complementaria y regionalizada visitar nuestra página web: www.breskotpharma.com

PRESENTACIONES.

Estuche x 14 sachets



SCIENCE. LIFE. HOPE.

GMP
CERTIFIED QUALITY

Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Farmoquímica S.A. Calle V. Eduardo 2293 La Paz - Bolivia Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operaciones Bioseguras, Operador Económico Autorizado (OEA). Cumpliendo con la norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados por IBMETRO de acuerdo a condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519

Somos una empresa socialmente comprometida, que promueve el cuidado del medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo.



06/21