

# VidiStar\*

## CLASE FARMACOLÓGICA.

Ácido hialurónico. Código ATC: S01KA01

## COMPOSICIÓN.

Cada mL contiene:

Hialuronato de sodio 4 mg (0,4%)

Excipientes: vehículo isotónico estéril, sorbato de potasio, otros c.s.

## FORMA FARMACÉUTICA.

Solución oftálmica.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Oftálmica.

## ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Lubricante y humectante ocular.

## INDICACIONES.

VIDISTAR\* está indicado como lubricante para el tratamiento del síndrome de ojo seco, proporcionando alivio temporal del ardor, sensación de cuerpo extraño, escozor y sequedad. Cuadros inflamatorios externos ocasionados por queratoconjuntivitis seca, queratitis por exposición, queratitis neuroparalítica, irritaciones oculares leves por rayos solares, polvo, aire, aguas cloradas, agentes químicos débiles y exposición a la luz intensa.

## POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.

La posología y duración del tratamiento dependerá del cuadro clínico y del criterio médico. Como posología de orientación se aconseja instilar 1 ó 2 gotas en el saco conjuntival inferior de ambos ojos cada 6 a 8 horas.

## EFFECTOS SECUNDARIOS.

Reacciones alérgicas y transitorias, inflamación del párpado o de la conjuntiva, eritema profundo, incremento en el lagrimeo o queratitis superficial.

## SOBREDOSIS.

En caso de sobrepasar la dosis diaria recomendada, lavar los ojos con agua tibia y acudir al centro médico más cercano. En caso de ingesta inadvertida deben ser tomadas medidas específicas para retardar la absorción.

## CONTRAINDICACIONES.

Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo.

## EMBARAZO Y LACTANCIA.

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia, salvo criterio médico.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

No se recomienda utilizar hialuronato de sodio junto a otros productos oftálmicos lubricantes, humectantes y otras soluciones detergentes o antisépticas.

En caso que sea necesario usar simultáneamente con otros fármacos de uso tópico oftálmico, su administración debe ser espaciada con un intervalo de al menos 5 minutos entre uno y otro.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Por contener sorbato de potasio puede causar dermatitis.

## LEYENDAS DE PROTECCIÓN.

Evitar el contacto del gotero con la piel o las pestañas, a fin de prevenir la contaminación de la solución estéril. Esta solución oftálmica se conserva para su uso adecuado hasta 30 días a partir de la primera apertura del frasco gotero. No usar después de la fecha de vencimiento. Almacenar a temperatura no mayor a 30 °C. Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo receta médica.

"Consulte con su oftalmólogo periódicamente para revisiones preventivas."

Contactenos a través de las líneas gratuitas:

Servicio de atención al consumidor: 800 16 2222

Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636

Para información complementaria y regionalizada visitar nuestra página web: [www.vidiline.com.bo](http://www.vidiline.com.bo)

## PRESENTACIÓN.

Frasco gotero x 15 mL



\*Marca Registrada



Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Farmoquímica S.A. Calle V. Eduardo 2293 La Paz - Bolivia  
Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operador Económico Autorizado (OEA). Cumpliendo con la norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados por IBMETRO de acuerdo a condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519  
**Somos una empresa socialmente comprometida, que promueve el cuidado del medio ambiente, la seguridad y salud en el trabajo.**

