

# DINOXAN<sup>®</sup>

## FAST-30

SIN AZÚCAR  
SIN GLUTEN

### CLASE FARMACOLÓGICA.

Derivados del ácido acético y sustancias relacionadas. Código ATC: M01AB15

### COMPOSICIÓN.

Cada comprimido sublingual contiene ketorolaco trometamina 30 mg, excipientes c.s.

### FORMA FARMACÉUTICA.

Comprimido.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Sublingual.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Analgésico, antiinflamatorio potente.

### PROPIEDADES.

Ketorolaco es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con propiedades analgésicas, antiinflamatorias debido a su mecanismo de acción inhibitoria sobre la síntesis de las prostaglandinas. A diferencia de otros AINEs cuenta con un mecanismo de acción dual que potencia el efecto analgésico; la vía de administración tiene un rol fundamental en el inicio de acción de los fármacos, siendo la vía sublingual una de las más efectivas y rápidas debido a su absorción inmediata, similar a la vía parenteral intravenosa.

La tecnología Pharmaburst utilizada en el comprimido de DINOXAN<sup>®</sup>FAST 30 asegura el tiempo de desintegración de 30 segundos, garantizando una acción más rápida. Cuenta con excelentes propiedades organolépticas en cuanto a la sensación bucal, ayudando a mejorar el sabor.

### INDICACIONES.

DINOXAN<sup>®</sup>FAST 30 está indicado en el tratamiento del dolor agudo moderado a severo. Dolor posoperatorio, postraumático y músculo esquelético. Cefaleas, migrañas, odontalgias, dolor ginecológico, renal, biliar.

### POSOLÓGIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.

Según criterio médico, como posología de orientación se aconseja: 1 comprimido sublingual cada 8 horas.

La administración sublingual permite mayor rapidez de acción por la absorción del fármaco a través de la mucosa oral. **Se administra colocando el comprimido debajo de la lengua hasta su disolución completa.** No ingerir el comprimido ni ponerlo sobre las encías.

No exceder 120 mg en 24 horas. En ancianos la dosis máxima recomendada es de 60 mg en 24 horas. Administrar por un máximo de 5 días.

### EFFECTOS SECUNDARIOS.

Somnolencia, mareos, cefalea, dolor gastrointestinal, dispepsia y náuseas. Se recomienda el uso a corto plazo por riesgo de úlcera gastroduodenal y de hemorragia.

### SOBREDOSIS.

Dolor abdominal, náuseas, vómitos, hiperventilación, úlcera gastroduodenal, gastritis erosiva y disfunción renal. En caso de sobredosis acudir al centro médico más cercano.

### CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad. Asma, hipovolemia de cualquier causa, deshidratación, antecedentes de úlcera péptica o de trastornos en la coagulación. Pacientes con síndrome parcial o completo de pólipos nasales, angioedema o broncoespasmo. Insuficiencia hepática grave, insuficiencia renal con creatinina mayor a 2,5 mg/dL.

### EMBARAZO Y LACTANCIA.

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia, salvo criterio médico.

### INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

Su efecto se potencia con el uso de salicilatos; aumenta la toxicidad de litio y con metotrexato disminuye la depuración y aumenta la concentración plasmática. Debido a su acción sobre la agregación plaquetaria no es conveniente su asociación con heparina o anticoagulantes orales. No debe emplearse ketorolaco en forma concomitante con otros AINEs.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Pacientes con alteraciones renales o hepáticas, con descompensación cardíaca, hipertensión o patología similar, en tratamiento con heparina, en ancianos. Úlcera gastroduodenal en evaluación o antecedentes de úlcera o hemorragia digestiva.

### LEYENDAS DE PROTECCIÓN.

Almacenar a temperatura no mayor a 30 °C y protegido de la humedad en el envase original. No contiene azúcar ni gluten. Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica.

“Consulte con su médico periódicamente para revisiones preventivas”.

Contáctenos a través de las líneas gratuitas:

Servicio de atención al consumidor: 800 16 2222

Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636

Para información complementaria y regionalizada visitar nuestra página web: [www.breskotpharma.com](http://www.breskotpharma.com)

### PRESENTACIÓN.

Estuche x 30 comprimidos



SCIENCE. LIFE. HOPE.

**GMP**  
CERTIFIED QUALITY

Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Fermoquímica S.A. calle V. Eduardo 2293 La Paz - Bolivia Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operaciones Bioseguras, Operador Económico Autorizado (OEA). Cumpliendo con la norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados por IBMETRO de acuerdo a condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519

**Somos una empresa socialmente comprometida, que promueve el cuidado del medio ambiente, la bioseguridad, la seguridad y salud en el trabajo.**

