



CLASE FARMACOLÓGICA.

Terapia hepática. Código ATC: A05BA

COMPOSICIÓN.

Cada ampolla ámbar x 20 mL contiene DL-metionina 200 mg, piridoxina HCl (vitamina B₆) 50 mg, colina cloruro 50 mg, glucosa anhidra 6.000 mg, ácido ascórbico (vitamina C) 500 mg, glucoronato de sodio 10 mg, excipientes: metabisulfito de sodio, otros c.s.

FORMA FARMACÉUTICA.

Solución inyectable.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Intravenosa lenta.

ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Colagogo. Hepatoprotector. Desintoxicante.

PROPIEDADES.

DEXAMINO®FUERTE reúne en una sola formulación todos los elementos, que tienen acción directa sobre los cuadros patológicos de los procesos gastrointestinales, biliares y hepáticos.

DL-metionina: Compuesto lipotrópico que facilita procesar grasas en el hígado. Colina: Previene la degeneración grasa. Piridoxina (vitamina B₆): Facilita la digestión de proteínas manteniendo el metabolismo de los aminoácidos. Ácido ascórbico (vitamina C): Cuenta con efecto antioxidante, que protege a las células frente a toxinas y aporta al aprovechamiento energético de los lípidos. Glucosa: Posee características energéticas, nutritivas, reconstituyentes y desintoxicantes. Glucoronato de sodio: Incrementa las albúminas disminuidas por daño hepático.

INDICACIONES.

Insuficiencia hepática aguda, intoxicaciones alimentarias, alcohólicas o por medicamentos. Medicación pre y posanestésica. Incremento de las necesidades de proteínas por exceso de esfuerzo. Síndrome de mala absorción. Pérdida del apetito. Necesidad de aumento de calorías. Convalecencia posquirúrgica. Melasma.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.

Según criterio médico. Como posología media se aconseja 1 ampolla I.V. lenta cada 24 horas durante 3 a 5 días.

EFFECTOS SECUNDARIOS.

Rara vez se han reportado casos de rash.

SOBREDOSIS.

A dosis terapéuticas el producto no es tóxico. Suspender la administración si aparecen signos de sobrehidratación o hiperglucemia, adoptando medidas correctivas.

CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad. Pacientes diabéticos.

EMBARAZO Y LACTANCIA.

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia, salvo criterio médico.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

Se recomienda no asociar con otros fármacos durante la administración.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

Por contener metabisulfito de sodio puede causar reacciones alérgicas en pacientes susceptibles.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN.

Almacenar a temperatura no mayor a 30 °C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Venta bajo receta médica. No usar después de la fecha de vencimiento.

"Consultar con su médico periódicamente para revisiones preventivas."

Contáctenos a través de nuestras líneas gratuitas:

Servicio de atención al consumidor: 800 16 2222

Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636

Para información complementaria y regionalizada visitar nuestra página web: www.breskotpharma.com

PRESENTACIÓN.

Caja x 10 ampollas



Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Farmoquímica S.A. La Paz - Bolivia Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG); Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operaciones Bioseguras. Operador Económico Autorizado (OEA). Cumpliendo con la norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados por IBMETRO de acuerdo a condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519.

Somos una empresa socialmente comprometida, promovemos el cuidado del medio ambiente, la bioseguridad, la seguridad y salud en el trabajo.



953

10/21