

# NOVADOL<sup>®</sup>

# 50

VENTA  
LIBRE



## CLASE FARMACOLÓGICA.

Paracetamol, combinaciones, excluye psicolépticos. Código ATC: N02BE51.

## COMPOSICIÓN.

Cada cápsula contiene:

Diclofenaco gastroresistente	50 mg
Paracetamol DC	500 mg
Excipientes c.s.	

## FORMA FARMACÉUTICA.

Cápsula.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN.

Oral.

## ACCIÓN TERAPÉUTICA.

Analgésico, antiinflamatorio.

## PROPIEDADES.

La combinación de diclofenaco y paracetamol generan una sinergia de efecto analgésico - antiinflamatorio con un inicio de acción en los primeros 15 minutos después de la administración. Contiene microgránulos de diclofenaco gastroresistente, que mejora la tolerancia en pacientes con antecedentes gastrointestinales; paracetamol en su presentación DC favorece la rápida absorción. La presentación en cápsula mejora la biodisponibilidad de los principios activos.

## INDICACIONES.

Dolores que cursen con inflamación de diversa etiología en su fase aguda. Dolor de cabeza, dental, menstrual y anexitis, muscular, articular, malestar general asociado a cuadros gripales. Dolor posquirúrgico, gota, cervicalgias, lumbalgias, ciatalgias, tendinitis, tenosinovitis. Dolor de oídos.

## POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN.

Se aconseja en mayores de 12 años y adultos 1 cápsula de NOVADOL<sup>®</sup> cada 8 a 12 horas. No sobrepasar 3 cápsulas en 24 horas.

## EFFECTOS SECUNDARIOS.

En pacientes hipersensibles pueden llegar a presentarse epigastralgia, náuseas, diarrea, constipación, cefalea, mareos que desaparecen espontáneamente o con la suspensión del medicamento.

## CONTRAINDICACIONES.

Hipersensibilidad.

## EMBARAZO Y LACTANCIA.

No se recomienda su uso durante el embarazo y la lactancia.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS.

No se recomienda administrar el fármaco por más de 7 días consecutivos, por sus posibles efectos a nivel gastrointestinal.

## SOBREDOSIS.

En caso de sospecha de sobredosis, acudir al servicio de urgencia más cercano.

## INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS.

Alcohol, enzimas hepatoinductoras, medicamentos hepatotóxicos, salicilatos, anticoagulantes orales.

## LEYENDAS DE PROTECCIÓN.

Almacenar a temperatura no mayor a 30 °C y protegido de la humedad en su envase original. No contiene gluten. Mantener fuera del alcance de los niños. Venta libre. Consulte con su médico si no advierte mejoría. No usar después de la fecha de vencimiento.

"Consulte con su médico periódicamente para revisiones preventivas."

Contáctenos a través de nuestras líneas gratuitas:

Servicio de atención al consumidor: 800 16 2222

Centro de farmacovigilancia: 800 16 2636

Para información complementaria y regionalizada visitar nuestra página web: [www.breskotpharma.com](http://www.breskotpharma.com)

## PRESENTACIÓN.

Dispensador x 200 cápsulas



SCIENCE. LIFE. HOPE.

**GMP**  
CERTIFIED QUALITY

Fabricado por Laboratorios de Cosmética y Fardoquímica S.A. calle V. Eduardo 2293 La Paz - Bolivia  
Empresa industrial farmacéutica certificada en Sistema Integrado de Gestión (SIG): Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, ISO 9001:2015 gestión de calidad, ISO 14001:2015 gestión ambiental, ISO 45001:2018 gestión de seguridad y salud en el trabajo, Operaciones Bioseguras, Operador Económico Autorizado (OEA). Cumpliendo con la norma de Defensa del Consumidor nuestros productos están certificados por IBMETRO de acuerdo a condiciones recomendadas en la NB-21003 y D.S. 29519

**Somos una empresa socialmente comprometida, que promueve el cuidado del medio ambiente, la bioseguridad, la seguridad y salud en el trabajo.**



05/21

1177

